

Bu üç mantar türü noktalı şapkalara sahiptir. Ancak noktalar geride sadece birkaçını bırakarak veya hiçbir nokta bırakmayarak kolayca düşebilir.



Röd flugsvamp

Amanita muscaria

Şapka 10-25 cm'dir. Şapkanın rengi parlak kırmızı ile solgun turuncu-kırmızı arasında değişir. Noktalar beyazdır. Sap büyük bir halkaya sahiptir ve sapın alt kısmı şişiktir. Yaprak döken ve kozalaklı ağaç ormanlarında yetişir.



Brun flugsvamp

Amanita regalis

Rengi kahverengi ile sarımsak kahverengi arasında değişen şapka 10-20 cm'dir ve sarımsak beyaz noktalara sahiptir. Sapta belirgin bir halka vardır ve sapın alt kısmı şişiktir. Kozalaklı ağaç ormanlarında yetişir.



Panterflugsvamp

Amanita pantherina

Şapka 5-12 cm'dir ve kahverengi nüanslara sahiptir. Noktalar beyazdır ve sapta her zaman bir halka bulunmaz. Sapın alt kısmı şişiktir. Yaprak döken ağaç ormanlarında ve parklarda, bazen de kozalaklı ağaç ormanlarında yetişir.

Zehirin etkileri ve belirtileri

Bütün bu mantarlar sinir sistemini bozan zehirler içerir. Sersemlik, şaşkınlık, korku, düşük bilinç seviyesi ve kasılmalar görülebilir. Bazen hastalık hissi ve kusma da meydana gelebilir.

Mantarlar hakkında nasıl daha fazla bilgi edinebilirsiniz?

- Bir mantar kursu veya gezisi için kaydolun. Eğitim kurumları ve mantar dernekleri kurslar ve geziler düzenliyor.
- Faydalı web siteleri: www.svampkonsulent.se
www.svampguiden.com



Bu broşür İsveç Zehir Bilgi Merkezi tarafından İsveç Mantar Danışmanları Birliği ile işbirliği yapılarak hazırlanmıştır



Fotoğraflar & düzenleme: Michael Krkorev

İsveç'teki en zehirli mantarlar!



STOP!

- Herhangi bir şekilde bu broşürdekilere benzeyen mantarları toplamayın!
- Sadece bildiğiniz mantarları toplayın!
- Tatlarına bakmayın! Zehirli mantarlar bile lezzetlidir!
- Mantarları, mantar konusunda bilgi sahibi olan yetişkinlere temizletin!
- Güncel bir mantar kitabı edinin!



Acil zehirlenme durumunda 112 (24 saat hizmet) 'yi arayın ve zehir ile ilgili bilgilendirme isteyin. 010-456 6700'i daha az acil vakalar için arayın.
www.gic.se



Vit flugsvamp

Amanita virosa

Mantar tamamen beyazdır. Şapka 5-12 cm'dir. Sap genelde bir halkaya sahiptir, ancak bazen halka bulunmaz. Çok genç olduklarında yumurtaya benzerler. Genelde derin bir şekilde yosuna gömülü olan sapın alt kısmı şişiktir. Ölüm meleği yosunlu çam ve kayın ormanlarında yetişir.

Zehrin etkileri ve belirtileri

Zehir karaciğere hasar verir. Belirtiler, mantarı tükettikten uzun saatler sonra başlayan sulu ishal, hastalık hissi ve kusmadır. Karaciğerde ciddi hasara yol açabilir. Zehirlenme ölümcül olabilir.

Lömsk flugsvamp

Amanita phalloides

Şapka 5-12 cm'dir. Şapka rengi çok değişkendir: Tamamen beyazdan, yeşil, gri ve açık kahverengiye kadar farklı nüansları bulunur. Solungaç benzeri alt kısımları beyazdır. Sap ince bir halkaya sahiptir, fakat halka her zaman bulunmaz. Sapın alt kısmı şişiktir. Köygöçüren mantarı yaprak dökken ağaç ormanlarında, karışık ormanlarda (birlikte yetişen yaprak dökken ve kozalaklı ağaçlar) ve kayın, meşe ile fındık ağaçlı ovalarda yetişir.

Zehrin etkileri ve belirtileri

Ölüm meleği ile aynı zehir içerir. Aynı belirtilere sahiptir ve aynı ölçüde ölümcüldür – bkz. yukarıda!



Toppig giftspindling

Cortinarius rubellus (C. speciosissimus)

Şapka 4-8 cm'dir. Mantarın tümü kırmızımsı kahverengi ile sarımtırak kahverengi arası bir renge sahiptir. Şapka her zaman olmasa da, genelde koni biçimindedir. Yosunlu çam ve kayın ormanlarında yetişir. Soyтары örümcek mantarı (*C. orellanus*) aynı zehri içeren benzer bir türdür. Meşe, kayın ve fındık ağaçlı yaprak dökken ormanlarda yetişir.

Zehrin etkileri ve belirtileri

Zehir böbreklere hasar verir ve tamamen tahrip edebilir. Zehirlenmeye ilişkin işaretler mantarı tükettikten birkaç gün sonra ortaya çıkar. Belirtileri susama, kas ağrıları, artan veya azalan idrar miktarıdır. Zehirlenme uzun süreli diyaliz tedavisine ve bazı durumlarda böbrek nakline bile yol açabilir.

Stenmurkla

Gyromitra esculenta

Sahte kuzu göbeği mantarı tamamen farklı bir mantar grubuna mensuptur. Şapka 4-12 cm, kahverengi ve beyin şeklindedir. Sapın rengi açık gri, kahverengi veya solgun mor nüansları arasında değişir. Sahte kuzu göbeği mantarı ilkbaharda Nisan'dan itibaren huş ağacı yaprak verene kadar genelde ormanlık yol kenarlarında, sökülmüş ağaç kütüklerinin yanında veya kesilerek ağaçsız bırakılan ormanlık alanlarda yetişir.

Zehrin etkileri ve belirtileri

Zehir sinir sistemini tahrip eder ve kan hücrelerine ve karaciğere de hasar verebilir. Belirtileri sersemlik, çift görme ve geveleyerek konuşmadır. Hastalık hissi ile mide ağrısı da olası belirtilerdir.

